

一般社団法人 日本創傷外科学会

## 専門医試験

～筆記試験過去問題集～

第5回専門医試験

問題 1) 局所陰圧閉鎖療法 (Negative Pressure Wound Therapy) で期待される効果として誤っているのはどれか

1. 浮腫軽減
2. 肉芽増生
3. 感染予防
4. 陰圧による創収縮
5. 過剰な滲出液の排除

問題 2) 放射線障害について正しいのはどれか

1. 非電離放射線の被曝に起因する
2. リンパ組織における感受性は低い
3. 初期に血管透過性の低下が見られる
4. 血管内膜のフィブリノイド変性が見られる
5. 慢性障害は一回の大量被曝に起因する

問題 3) ケロイドについて正しいのはどれか

1. 白人に多い
2. 壮年期に好発する
3. プタでもしばしば認められる
4. 肩甲部は好発部位の一つである
5. 組織学的に好塩基性の膠原線維束が認められる

問題 4) Vancouver burn scar scale の評価項目に含まれないのはどれか

1. 血行
2. 面積
3. 高さ
4. 柔軟性
5. 色素沈着

問題 5) 下肢虚血の評価法として誤っているのはどれか

1. ABI (ankle brachial index)
2. SPP (skin perfusion pressure)
3. TBI (toe brachial index)
4. TcPO<sub>2</sub> (transcutaneous pressure of oxygen)
5. VFI (venous filling index)

問題 6) 次の外用薬の中で基剤が水溶性に属するのはどれかか。

1. 単軟膏
2. 白色ワセリン
3. プラスチベース
4. マクロゴール軟膏
5. バニシングクリーム

問題 7) 湿潤環境維持が創傷治癒に有利な理由として誤っているのはどれか

1. 細胞遊走を促す
2. マトリックス形成を促す
3. 潰瘍周囲の浸軟を促す
4. 増殖因子の活性化を促す
5. 自己融解デブリードマンを促す

問題 8) 顔面熱傷において早めの植皮が望ましい部位はどれか

1. 頬部
2. 眼瞼部
3. 前額部
4. 鼻部
5. 耳介部

問題 9) 坐骨部褥瘡の手術では通常用いられないものはどれか

1. Gluteus maximus musculocutaneous flap
2. Transverse lumbosacral back flap
3. Gracilis musculocutaneous flap
4. Tensor fascia latae musculocutaneous flap
5. Posterior thigh flap

問題 10) 褥瘡の状態評価方法「DESIGN」の項目に含まれないのはどれか

1. 滲出液の量
2. 肉芽の状態
3. 褥瘡の深さ
4. 褥瘡の大きさ
5. 骨突出

問題 11) 顔面神経損傷にて眉毛挙上が出来なくなった場合に損傷の疑われる枝はどれか

1. 前頭枝
2. 側頭枝
3. 頬骨枝
4. 頬筋枝
5. 下顎縁枝

問題 12) 頬骨骨折の症状で誤っているのはどれか

1. 頬部陥凹
2. 咬合異常
3. 開口障害
4. 頬部知覚障害
5. 眼球上転障害

問題 13) 切断指の分類で誤っているものを選べ

1. 玉井分類は遠位端を Zone I とし、近位に向かって Zone V まで分類される
2. 玉井分類の Zone III は中節骨での切断である
3. 玉井分類の拇指切断において Zone III は基節骨での切断である
4. 石川分類の subzone II は指動脈弓より近位の切断である
5. 石川分類の subzone I での切断は composite graft で生着が期待できる

問題 14) 皮弁と栄養血管の組み合わせで誤っているものを選べ

1. 前外側大腿皮弁 - 外側大腿回旋動脈下行枝
2. 大腿筋膜張筋皮弁 - 外側大腿回旋動脈横行枝
3. 腹直筋皮弁 - 浅下腹壁動脈
4. 広背筋皮弁 - 胸背動脈
5. 大胸筋皮弁 - 胸肩峰動脈

問題 15) 皮弁と栄養血管の組み合わせで誤っているものを選べ

1. 尺骨神経麻痺 - 鷲手
2. 正中神経麻痺 - 猿手
3. 橈骨神経麻痺 - 下垂手
4. 腓骨神経麻痺 - 底屈障害
5. 後脛骨神経麻痺 - 足底知覚障害